MALLATTIE GASTROENTEROLOGICHE
forte impatto epidemiologico

L**e malattie gastroenterologiche hanno un impatto importante sulla salute della popolazione e sui costi del sistema sanitario**, rappresentano infatti una delle più importanti cause di morte nella popolazione generale, e sono tra le prime cause di ricovero ospedaliero e di richieste di prestazioni ambulatoriali.

La mortalità nella popolazione generale per queste malattie è pari al 13% circa.
I tumori dell'apparato digerente rappresentano la prima causa di morte per tumori.
Il cancro del colon-retto è il 2° più frequente tra tutti i cancri



Cancro Colorettale

il più comune cancro dell'apparato digerente, secondo maggior killer in Europa

in Italia

481.000 persone con pregressa diagnosi di tumore del colon-retto (CCR)

50.000 nuovi casi/anno

19.000 decessi/anno

(ogni 25 minuti un italiano muore d CCR)

Da

I numeri del cancro colorettale

M

1° Prostata (20%)
2° Polmone (15%)
3° CCR (14%)
4° Vescica (10%)
5° Stomaco (5%)

F

1° Mammella (29%)
2° CCR (12%)
3° Polmone (6%)
4° Tiroide (5%)
5° Vescica (7%)



ttori di rischio per cancro colorettale

quale proporzione i nuovi casi di cancro
orettale sono attribuibili a fattori di rischio
dificabili ?



maggior parte (63% -76%) delle attuali morti di CRC è
a attribuita al mancato utilizzo dello screening

Chyke A. Doubeni Gastroenterology 2019;156:63–74

Islami F Cancer J Clin 2018
Castellò A Eur J Nutr 2019
Zhang FF JNCI Cancer Spectr 2019
IARC-NCI Ann Oncol 2019

Proiezione dei decessi per cancro



Projecting Cancer Incidence and Deaths to 2030: The Unexpected Burden of Thyroid, Liver, and Pancreas Cancers in the US
Lola Rahib, **DOI:** 10.1158/0008-5472.CAN-14-0155 Published June 2014

NUMERI
EL CANCRO
N ITALIA
022

Tipo di tumore	Percentuale di morti evitabili (N=4.450.000 morti prevenibili nel mondo nel 2019) Uomini (N=2.870.000) %	Donne (N=1.580.000) %	Tutti (N=4.450.000) %
Polmone, trachea, bronchi	42,2	27,2	36,9
Colon e retto	13,3	15,8	14,2
Esofago	9,7	3,8	7,6
Cervice uterina	NA	17,9	6,3
Fegato	6,6	4,1	5,7
Stomaco	6,6	2,5	5,2
Mammella	0,1	11,0	4,0
Pancreas	3,5	4,6	3,9
Labbro e cavo orale	3,3	1,9	2,8
Vescica	2,8	0,8	2,1
Laringe	2,8	0,4	2,0
Leucemia	2,0	1,7	1,9
Altri tumori della faringe	2,2	0,4	1,6
Rene	1,3	1,1	1,3
Utero	NA	2,3	0,8
Nasofaringe	1,1	0,2	0,8
Prostata	1,0	NA	0,7
Ovaio	NA	1,7	0,6
Mesotelioma	0,7	0,4	0,6
Cistifellea e dotti biliari	0,2	1,3	0,6
Linfoma non-Hodgkin	0,3	0,4	0,3
Mieloma multiplo	0,1	0,3	0,2
Tiroide	0,1	0,2	0,1

TABELLA 3. Morti per tumore attribuibili a fattori di rischio evitabili nel mondo nel 2019; quota percentuale di morti evitabili sul totale delle morti per tumore evitabili

PROCEDURA APPROPRIATA

L'appropriatezza definisce un intervento sanitario (preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo) correlato al bisogno del paziente (o della collettività), fornito nei modi e nei tempi adeguati, sulla base di standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi

Ministero della Salute

Ministero salute (2006)